

# Isordil

*Informatie*  
voor patiënten

## Werking

Het geneesmiddel Isordil wordt voorgeschreven aan elke patiënt met angina pectoris (een vernauwing van de kransslagaders) of een hartinfarct. Bij gebruik van Isordil worden de bloedvaten aanzienlijk wijder, waaronder ook de kransslagaders. Dit zorgt voor een betere doorbloeding van de hartspier. Hierdoor neemt de pijn op de borst af of verdwijnt. Isordil is verkrijgbaar in tablet en sprayvorm.

## Gebruiksadviezen en waarschuwingen

Krijgt u pijn op de borst? Volg dan de volgende stappen:

- Ga rustig zitten of liggen.
- Leg een tablet onder de tong of neem een spray nitroglycerine. Laat de tablet smelten, niet doorslikken.
- De pijn moet binnen 2 tot 5 minuten verminderen of verdwenen zijn.
- Komt de pijn na 5 tot 10 minuten weer terug of wordt de pijn niet minder? Gebruik dan een tweede spray of tablet. Doe dit alleen als u niet duizelig bent.
- Waarschuw direct een arts of vervangend huisarts als de pijn niet overgaat. Heeft u meerdere keren per dag Isordil nodig om een aanval van angina pectoris te verminderen? Raadpleeg dan uw huisarts.

## Aanvang en duur van de werking

- Na het toedienen van de spray of tablet onder de tong begint de werking na 2 tot 3 minuten. De werking houdt 2 tot 3 uur aan.
- Heeft u de tablet per ongeluk doorgeslikt? Dan begint de werking binnen 30 minuten en houdt ongeveer 4 uur aan.
- Zorg ervoor dat u altijd en overal Isordil bij u heeft en het kan gebruiken als het nodig is.
- Zorg ervoor dat u regelmatig de houdbaarheidsdatum van Isordil controleert.

## Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. Vooral aan het begin van de behandeling of wanneer de dosering wordt verhoogd kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen: hoofdpijn, bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die zich soms uit in duizeligheid en blozen. De frequentie van deze bijwerkingen vermindert langzaam na een paar dagen bij het voortzetten van de behandeling.

De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

- hoofdpijn.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

- bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die zich soms uit in duizeligheid ;
- blozen;
- duizeligheid;
- versnelde hartslag;
- bleekheid;
- overmatig transpireren;
- gevoel van zwakte;
- slaperigheid.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):

- rusteloosheid;
- flauwvallen (soms tegelijk met trage hartslag en bewustzijnsverlies);
- ernstig verlaagde bloeddruk die kan leiden tot versterkte verschijnselen van angina pectoris;
- misselijkheid;
- braken;
- huiduitslag.

Bij het aanhouden van deze klachten is het verstandig uw arts te raadplegen.

### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. De werkzame stof in dit middel is isosorbidedinitraat. Elke tablet bevat 5 mg isosorbidedinitraat. De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, cellulose in poedervorm (E460), maïszetmeel (gedroogd), erythrosine lake 40% (E127), magnesiumstearaat (E572).
- U gebruikt bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen, zogenaamde fosfodiësteraseremmers (bijvoorbeeld sildenafil, tadalafil, vardenafil).

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Over de mogelijke schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor schadelijkheid uit dierproeven naar voren gekomen. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

## **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Vooraf in het begin van de behandeling kunnen duizeligheid en een gevoel van zwakte optreden. Hierdoor kan uw reactievermogen nadelig worden beïnvloed. Wees daarom voorzichtig bij het besturen van een auto of het gebruiken van machines of gereedschap als u dit middel gebruikt.

## **Vragen**

Heeft u vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Stel ze dan gerust aan uw huisarts of cardioloog, de verpleegkundige of uw apotheker. Het is belangrijk om problemen bij het gebruik van dit geneesmiddel te melden aan uw arts of verpleegkundige. Neem het geneesmiddel in zoals uw behandelend arts met u heeft afgesproken. Dit zal het verantwoord gebruik van dit middel bevorderen.

## **Adres en telefoonnummer**

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis  
Weg door Jonkerbos 100  
6532 SZ Nijmegen

### **Polikliniek cardiologie (B18)**

Telefoon (024) 365 80 30

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar

### **Eerste harthulp (B36)**

Telefoon (024) 365 84 20 (24 uur per dag bereikbaar)

Website: [www.cardiologie.cwz.nl](http://www.cardiologie.cwz.nl)