

Operatie aan de traanwegen (sondage)



Adviezen voor thuis

Wat krijgt u mee naar huis?

- Een recept voor oogdruppels en pijnstilling.
- Een controleafspraak is in principe niet nodig. Mochten er toch nog klachten blijven bestaan dan maakt u opnieuw een afspraak op het poliklinisch spreekuur.
- De brief voor de huisarts wordt digitaal verstuurd.

Adviezen voor thuis

- Voorkom de eerste 2 weken na de operatie drukverhoging in de neus. Dit kunt u voorkomen door uw kind zo min mogelijk te laten bukken, tillen en persen. Uw kind mag de neus niet snuiten, wel zachtjes ophalen. Niezen bij voorkeur met de mond open.
- Voorkom loslaten van het eventueel achtergelaten siliconenrubber slangetje/buisje van Jones. Dit doet u door uw kind niet in de ogen te laten wrijven. Mocht het loslaten toch gebeuren dan neemt u contact op met de oogarts/KNO arts.
- Door warmte ontstaat verwijding van de bloedvaten waardoor een bloeding kan optreden. U kunt dit voorkomen door uw kind niet te heet te laten douchen, eten en drinken iets af te laten koelen en de eerste 3 dagen niet in de zon te laten.
- Het geopereerde oog moet gedurende 4 weken gedruppeld worden.

Tobradex oogdruppels

Eerste week 4 x per dag 1 druppel

Tweede week 3 x per dag 1 druppel

Derde week 2 x per dag 1 druppel

Vierde week 1 x per dag 1 druppel

- Een goede pijnbestrijding is belangrijk voor het genezingsproces. Paracetamol is vaak voldoende. Afbouwen van pijnstilling mag op geleide van de pijn.

Paracetamol:.....x per dagmg (zetpil/tablet)

Tijden:uur.....uur.....uur.....uur

Bellen bij problemen

Bij klachten die horen bij de operatie kunt u overdag bellen naar de polikliniek KNO (B66), (024) 365 82 25.
's Avonds, 's nachts en in het weekend belt u naar de Spoedeisende hulp van het CWZ, (024) 365 83 22.