

Azathioprine

Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa

Informatie
voor patiënten

Uw maag-, darm- en leverarts (MDL-arts) heeft u azathioprine (merknaam Imuran®) voorgeschreven voor de behandeling van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder geeft u algemene informatie over het medicijn. Lees voor het gebruik van het medicijn ook de bijsluiter zorgvuldig door.

Heeft u na het lezen van deze folder en de bijsluiter nog vragen dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleeg- kundige van het verpleegkundig spreekuur.

Werking van azathioprine

Azathioprine is een afweeronderdrukkend medicijn. Daardoor kan azathioprine de klachten verminderen die passen bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, zoals buikpijn, diarree, gewichtsklachten en vermoeidheid. In het algemeen kunt u pas na 4 tot 8 weken effect verwachten. De werking is na meerdere maanden maximaal. Als azathioprine een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken. Helaas wordt niet bij iedereen een gunstig effect gezien.

Gebruik

Azathioprine wordt toegediend in tabletten. De MDL-arts bepaalt de dosering. De tabletten moeten bij de maaltijd ingenomen worden met een glas water en mogen niet fijngemaakt of gekauwd worden. Dit om contact met de binnenkant van de tablet te vermijden. Ook mag bij breken de binnenkant van de tablet niet aangeraakt worden. Het medicijn moet precies volgens voorschrift van de arts gebruikt worden.

Bijwerkingen

Het gebruik van azathioprine kan leiden tot enkele bijwerkingen, die in het algemeen verdwijnen na het stoppen van de behandeling. Als u de bijsluiter doorleest, zult u veel bijwerkingen tegenkomen, echter vele hiervan komen maar heel weinig voor.

Hieronder worden de meest voorkomende bijwerkingen vermeld:

- Stoorissen in de bloedaanmaak door remming van aanmaak van het beenmerg. Dit kan zich uiten door bloedarmoede of tekort aan witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit wordt gecontroleerd door bloedonderzoek.
- Verhoogde kans op infecties.
- Leverproblemen. Deze worden aangetoond door bloedonderzoek.
- Alveesklierontsteking. Dit uit zich door hevige pijn in de bovenbuik, meestal binnen de eerste maanden na het beginnen met de medicatie.
- Misselijkheid en buikpijn.
- Hogere gevoeligheid voor blootstelling aan de zon en zonnebank.

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Maak dan een afspraak met uw behandelend arts. Stop niet uit eigen initiatief met het middel, overleg eerst altijd met uw MDL-arts.

Bloedcontrole

Voordat u begint met het middel wordt er bloed geprikt om bepaalde (virale) infecties uit te sluiten. Door regelmatig het bloed te onderzoeken, kunnen vroegtijdig leverbeschadiging en stoornissen in de bloedaanmaak worden opgespoord. Houdt u zich daarom goed aan de afspraken voor bloedcontrole.

Wanneer zo snel mogelijk contact opnemen met uw behandelend arts?

- Koorts (temperatuur hoger dan 39 graden) of koorts met een ernstig ziektegevoel.
- Blaasjes in de mond, aanhoudende bloedneuzen, moeilijk te stoppen bloedingen of plotselinge blauwe plekken.
- Bloedarmoede, te merken aan ernstige vermoeidheid, bleekheid, kortademigheid of hartkloppingen.
- Hevige pijn in de bovenbuik met misselijkheid en een opgeblazen gevoel.
- Galstuwing. Dit kan te merken zijn aan geelzucht (gele verkleuring van huid en oogwit), donkergekleurde urine en ontkleurde ontlasting, jeuk over het hele lichaam.

Aanvullende informatie

Alcohol

Zowel alcohol als azathioprine hebben effect op de lever en alvleesklier. Neem daarom niet meer dan één alcoholconsumptie per dag.

Zon

- Vermijd felle zon en zonnebank.
- Bescherm de huid tegen verbranden.
- Controleer de huid regelmatig op veranderingen (ontstaan van wratten, moedervlekken die veranderen van kleur of grootte, of gaan jeuken of bloeden).

Risico op kanker

Bij langdurig gebruik kan de kans op huid- en lymfeklierkanker iets vergroot zijn. Let daarom op huidveranderingen zoals genoemd bij het kopje 'zon' en op ongewone knobbels in oksels, liezen of hals.

Combinatie met andere geneesmiddelen

- Azathioprine kan in combinatie met acenocoumarol en fenprocoumon een verhoogde bloedingskans geven. Licht de trombosedienst daarom in over uw gebruik van azathioprine.
- Bij gelijktijdig gebruik met allopurinol (middel tegen jicht) moet de dosis azathioprine worden aangepast.
- Azathioprine gaat niet samen met het inenten met verzwakte levende virussen. Overleg van tevoren met uw MDL-arts, huisarts of de GGD. Eventueel kan vaccinatie voor start van azathioprine worden overwogen.

- Een griepvaccinatie wordt wel aanbevolen, vanwege de vergrote kans op infecties.
- Gebruik azathioprine niet samen met andere immuun medicijnen zonder overleg met uw MDL-arts.

Zwangerschap

Azathioprine is in de zwangerschap in het algemeen veilig gebleken voor de foetus. Echter zoals met ieder medicijn kunnen er risico's zijn. Zowel voor vrouwen als mannen die azathioprine gebruiken geldt dat, om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, het belangrijk is dat u voor een eventuele zwangerschap overlegt met uw MDL-arts.

Vragen

Bij vragen of problemen neemt u contact op met uw MDL-arts of verpleegkundig specialist. Vermeld hierbij altijd dat u azathioprine gebruikt. De verpleegkundig specialist is alle dagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur, telefoonnummer (024) 365 80 72. U kunt ook een e-consult sturen naar uw zorgverlener via MijnCWZ: www.mijncwz.nl.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de polikliniek MDL. Er kan een andere patiënt in uw plaats komen en met u maken wij een nieuwe afspraak.

Adres en telefoonnummer

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

Polikliniek MDL (A71)

Melden bij meldpunt 2B
Telefoon (024) 365 80 70 (bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur)

IBD verpleegkundig specialist

Telefoon (024) 365 80 72 (bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur)
E-consult via MijnCWZ: www.mijncwz.nl

Website: www.mdl.cwz.nl