

# Opspuiten of dotteren van de traanweg op de afdeling radiologie

Informatie  
voor patiënten

**In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om een traanweg te laten opspuiten en/of dotteren (oprekken). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie als na het opspuiten van de traanweg blijkt dat dotteren nodig is.**

Bij dit onderzoek worden de traanwegen doorgespoten met een kleine hoeveelheid röntgencontrastmiddel, waarna een foto wordt gemaakt. Op het röntgenbeeld is te zien of de traanweg verstopt of vernauwd is en waar de eventuele afwijking zit. Het contrastmiddel dat via een dun buisje via het traankanaaltje in het ooglid wordt ingespoten, komt uiteindelijk in de neus terecht en stroomt dan naar de keel.

Bij het **dotteren** van de traanweg wordt de traanzak met behulp van een ballonnetje opgerekt en hierdoor beter doorgankelijk gemaakt. Ongeveer drie van de vier patiënten heeft veel baat bij deze behandeling.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten te vermelden.

Als u bloedverdunders gebruikt, kan het onderzoek gewoon doorgaan. U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn, dus u mag eten en drinken van te voren.

### **Het onderzoek**

U ligt op uw rug op een röntgentafel. Met oogdruppels wordt het desbetreffende oog verdoofd. De uitmonding van de traanweg in het ooglid wordt iets opgerekt waarna de radioloog een dun buisje in de traanweg brengt. Vervolgens wordt een geringe hoeveelheid contrastvloeistof ingebracht en worden er foto's gemaakt.



Bij een dotter van de traanweg wordt via hetzelfde slangetje een dun draadje in de traanweg gebracht, dat er bij de neus weer uitkomt. Daarover wordt een dotterballon geschoven, die ter plaatse de traanweg oprekt. Het oprekken is gevoelig. Vooraf wordt neusspray en plaatselijke verdoving rondom het oog gegeven. Het opspuiten van de traanweg duurt ongeveer 10 minuten, het dotteren van de traanweg ongeveer 30 minuten.

### **Na het onderzoek**

Na het opspuiten van de traanweg is geen speciale nazorg nodig. u krijgt een recept mee voor neus -en oogdruppels. Dit kan opgehaald worden bij de CWZ apotheek.

Het is beter als u na de dotterbehandeling niet zelf met de auto naar huis rijdt in verband met eventueel verminderd zicht.

### **Uitslag**

Na een 'traanwegopspuiting' gaat u terug naar de poli waar u een afspraak maakt voor het bespreken van de uitslag.

Na een 'traanwegdotter' gaat u naar de poli om een controle-afspraken te maken voor 6 tot 8 weken na de dotterbehandeling.

### **Bijwerkingen/complicaties**

Het is mogelijk dat na de opspuiting of de dotterprocedure het oog er enigszins rood uitziet en het ooglid wat blauw wordt. Dit is een normaal verschijnsel en trekt na enige dagen weer weg.

### **Vragen**

Als u verwacht dat het onderzoek problemen geeft, neem dan vooraf telefonisch contact op met de afdeling radiologie. Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stel deze dan gerust aan de telefoniste. Zij geeft u graag antwoord.

### **Bericht van verhindering**

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de afdeling radiologie, telefoon: (024) 365 74 31. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

## Afspraak

..... datum

..... dag

..... uur.

## Adres en telefoonnummer

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis  
Weg door Jonkerbos 100  
6532 SZ Nijmegen

*Afdeling radiologie (B50)*  
Telefoon (024) 365 74 31

Website: [www.radiologie.cwz.nl](http://www.radiologie.cwz.nl)