

Nazorg bij contrastvloeistof naast het bloedvat

Extravasatie

Informatie
voor patiënten

U heeft net een onderzoek gehad op de afdeling Radiologie van CWZ waarbij een contrastvloeistof is ingespoten. Contrastvloeistof is een vloeistof die ervoor zorgt dat bloedvaten en organen duidelijker worden afgebeeld op de foto's. Tijdens het inspuiten is een deel van deze vloeistof buiten het bloedvat terecht gekomen. Helaas treedt deze complicatie af en toe op. Dit kan een brandend of pijnlijk gevoel geven. Ook kan een zwelling en roodheid optreden. Deze klachten duren meestal 2 tot 4 dagen, maar soms zelfs een week.

In deze folder wordt beschreven wat u kunt doen om te zorgen dat de zwelling verdwijnt. Heeft u na het lezen nog vragen, bel dan gerust naar de afdeling Radiologie van CWZ.

U heeft op de afdeling Radiologie gesproken met:

Naam laborant:

Naam radioloog:.....

Wat kunt u doen?

- Probeer uw arm zoveel mogelijk omhoog te houden (kussen onder de arm wanneer u in een stoel zit).
- Leg vooral de eerste 24 uur na het onderzoek vochtige koude kompressen (washandjes, handdoekjes of een coldpack) op de zwelling.
- Tegen de pijn kunt u Paracetamol innemen.

Wanneer moet u contact opnemen?

- Wanneer de huid donkerder wordt (erger dan door een blauwe plek).
- De pijn erger wordt.
- Als u een doof gevoel krijgt.
- Wanneer u de arm minder goed kunt bewegen.

Binnen kantooruren belt u met uw huisarts of de dienstdoende huisarts.

Buiten kantoor tijden belt u met de huisartsenpost.

Laat weten dat u een onderzoek op de afdeling Radiologie heeft gehad en dat u last heeft van contrastvloei stof naast het bloedvat. Het kan zijn dat u gevraagd wordt naar de huisarts te komen voor behandeling.

Wilt u bij uw bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost deze folder meenemen?

Adres en telefoonnummers

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

Afdeling radiologie (B50)
Telefoon (024) 365 74 78

Website: www.cwz.nl