

Instructiekaart: gebruik van verdovende zalf (Lidocaïne/Prilocaine in crème of EMLA)

Beste ouder/verzorger,



U heeft een recept meegekregen voor een verdovende zalf. Dit medicijn wordt gebruikt om de huid te verdoven bij kleine ingrepen zoals het afnemen van bloed of het plaatsen van een infuus. De arts wijst u de plaatsen aan, waar u de crème mag aanbrengen.

Handrug

Elleboogplooi

- ☐ Rechts
☐ Links

- ☐ Rechts
☐ Links



Aanbrengen van de crème

Stap 1: Breng een flinke dot crème aan op de aangewezen plaatsen (zie afbeelding hierboven). Breng de crème altijd op *minimaal twee plekken* aan.

Stap 2: Plak de pleister met de kleefzijde op de huid, over de crème.

Stap 3: Verwijder de witte papieren randen om de pleister.

Stap 4: Noteer het tijdstip van afplakken en laat de crème minimaal 60 minuten inwerken. De crème mag maximaal 5 uur op de huid blijven zitten! De werking houdt ongeveer 2 uur aan na het verwijderen van de crème aan.

Bij kinderen onder de 1 jaar nooit op meer dan 2 plekken een klein dotje crème aanbrengen. De crème alleen aanbrengen op een huid zonder verwondingen.