

Nijmegen, Januari 2021.

Onderwerp: Corona virus (COVID-19) en vaccinatie.

Geachte heer/ mevrouw,

De polikliniek Maag Darm en Leverziekten (MDL) ontvangt de laatste dagen veel vragen of patienten die de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hebben en afweer onderdrukkende medicijnen (bijvoorbeeld Prednison, Infliximab etc) gebruiken, gevaccineerd kunnen worden met het Corona vaccin.

Corona-vaccinatie en IBD

Op dit moment zijn Pfizer en Moderna de eerste twee vaccins tegen het corona virus die door het EMA (European Medicines Agency) zijn goedgekeurd voor gebruik. Diverse vaccins zijn nog in ontwikkeling. De beschikbare vaccins zijn geen levende vaccins. Deze kunnen worden gebruikt samen met afweer onderdrukkende medicatie. De vaccins zijn echter nog niet getest op mensen met Crohn en colitis. Daarom is er nu nog niets te zeggen over de effectiviteit ervan en eventuele risico's hiervan. De voordelen wegen op tegen de eventuele (zeer kleine) risico's. De nadelen van deze vaccins zijn dat ze twee keer moeten worden toegediend met een tussenpoos van drie tot vier weken. De bijwerkingen van deze vaccins lijken sterk op de voorbijgaande bijwerkingen die we zien bij de meeste andere vaccins, waaronder griep, en omvatten lokale reacties zoals pijn in de bovenarm gedurende een paar dagen en in sommige gevallen vermoeidheid, hoofdpijn, lichaamstemperatuur, en zelden kan zelfs koorts optreden, die één tot drie dagen aanhoudt. Zoals bij alle vaccins, er zijn enkele gevallen van allergische reacties gemeld, maar deze zijn beperkt tot patiënten met een sterke allergische aanleg - iets heel anders dan een auto-immuunziekte. Tegelijkertijd willen we u eraan herinneren dat vaccins over het algemeen een zeer krachtig hulpmiddel zijn om ernstige infecties te voorkomen. Daarom moeten andere aanbevolen vaccinaties voor patiënten met chronische ziekten en / of immunosuppressiva, zoals vaccinatie tegen influenza, pneumokokkenvaccins of gordelroosvaccins, tijdens de pandemie worden toegediend, net zoals ze tijdens normale tijden moeten worden toegediend.

De Nederlandse Vereniging van Maag Darm en Leverartsen (NVMDL) raadt daarom mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa aan om zich te laten vaccineren. Op welk moment dat mogelijk

wordt is nog onbekend. De overheid heeft al wel een (voorlopige) tijdsplanning voor het vaccineren gemaakt. Deze planning kan nog wijzigen.

Mocht u na het lezen van de onderstaande tekst nog vragen hebben die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn, dan vragen wij u om dit via Mijn Patientenportaal te doen. U kunt daar een e-consult sturen. Uw vraag komt dan terecht bij de verpleegkundig specialist.

Verder willen wij u verwijzen naar de website van het RIVM waar u veel informatie kunt vinden. Volg de adviezen van het RIVM (<https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden>). U kunt ook bellen naar het RIVM met vragen over het coronavirus: **0800-1351** (8.00 – 20.00 uur). Ook op de website van de patiëntenvereniging van de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa kunt u aanvullende informatie vinden <https://www.crohn-colitis.nl/actueel/coronavirus-vraag-en-antwoord/>. Daarnaast willen wij u wijzen op de website van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Hier kunt u ook veel informatie vinden <https://www.cwz.nl/patient/algemene-informatie-patienten/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus>

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Polikliniek Maag Darm en Leverziekten.
024-3658070.

Deze informatie is opgesteld op basis van de actuele inzichten en kan aangepast worden op basis van de ontwikkelingen rondom het coronavirus